

# Who Needs an Additional or Booster COVID-19 Vaccine?

Currently, CDPH is recommending an Additional Pfizer/Moderna dose or a Booster Pfizer Moderna or J&J dose of vaccine for certain individuals.

Based on self-attestation, individuals eligible for the booster include:

<p><b>ADDITIONAL PFIZER/MODERNA DOSE</b></p> <p>(at least 28 days after Pfizer/Moderna primary series)</p>	<p><b>PFIZER BOOSTER DOSE</b> (at least 6 months after Pfizer primary series)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pfizer</li> <li>➤ Moderna (0.25 ml)</li> <li>➤ J &amp; J</li> </ul>	<p><b>MODERNA BOOSTER DOSE</b> (at least 6 months after Moderna primary series)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Moderna (0.25 ml)</li> <li>➤ Pfizer</li> <li>➤ J &amp; J</li> </ul>	<p><b>J&amp;J BOOSTER DOSE</b> (at least 2 months after 1<sup>st</sup> J&amp;J)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Moderna (0.25 ml)</li> <li>➤ Pfizer</li> <li>➤ J &amp; J</li> </ul>
<p>Received:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Organ transplant and are taking medicine to suppress the immune system</li> <li>▶ Stem cell transplant within the last 2 years or are taking medicine to suppress the immune system</li> </ul> <p>Actively have:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Cancer and receiving treatment for tumors or cancers of the blood</li> <li>▶ Moderate or severe primary immunodeficiency (such as DiGeorge syndrome, Wiskott-Aldrich syndrome)</li> <li>▶ Advanced or untreated HIV infection</li> <li>▶ Active treatment with high-dose corticosteroids or other drugs that may suppress your immune response</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 65+</li> <li>▶ 18-64 years of age with high risk for occupational or institutional exposure. This includes: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ healthcare workers</li> <li>✓ first responders</li> <li>✓ teachers/school staff</li> <li>✓ day care staff</li> <li>✓ grocery workers</li> <li>✓ agricultural workers</li> <li>✓ workers in homeless shelter</li> <li>✓ prison/jail/correctional staff</li> <li>✓ staff in SNF or LTCF</li> <li>✓ manufacturing workers</li> <li>✓ U.S. Postal Service workers</li> <li>✓ public transit workers</li> </ul> </li> <li>▶ 18-64 years of age with a medical condition from the list below: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cancer</li> <li>✓ Chronic kidney disease</li> <li>✓ COPD, including asthma</li> <li>✓ Dementia</li> <li>✓ Type 1 or Type 2 Diabetes</li> <li>✓ Downs Syndrome</li> <li>✓ Coronary Artery Disease including: Heart Failure/Cardiomyopathies</li> <li>✓ HIV Infection</li> <li>✓ Primary Immunodeficiency Diseases (i.e. Wiskott-Aldrich, Benta, ALPS)</li> <li>✓ Overweight</li> <li>✓ Pregnant and recently pregnant people (for at least 42 days following end of pregnancy)</li> <li>✓ Sickle cell disease or thalassemia</li> <li>✓ Smoking, current/former</li> <li>✓ Stem cell transplant within the past 2yrs</li> <li>✓ Stroke or cerebrovascular disease</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ All individuals 18+ who <u>only</u> received 1 dose of J&amp;J Covid vaccine</li> </ul>	

People should talk to their healthcare provider about their medical condition, and whether getting an additional dose is appropriate for them. Patients can choose to mix and match COVID-19 booster vaccine doses, utilizing the booster dose time frame from their original series.

## ¿Quién necesita una vacuna adicional contra el COVID-19?

Actualmente, CDPH está recomendando una dosis adicional de Pfizer / Moderna o una dosis de refuerzo de Pfizer, Moderna o J&J para ciertas personas.

Basado en la auto-atestiguación, los individuos elegibles para el elevador de voltaje incluyen:

<b>DOSIS ADICIONAL DE PFIZER/MODERNA</b> (al menos 28 días después de la serie primaria Pfizer/Moderna)	<b>DOSIS DE REFUERZO DE PFIZER</b> (al menos 6 meses después de la serie primaria de Pfizer)	<b>DOSIS DE REFUERZO DE MODERNA</b> (al menos 6 meses después de la serie primaria de Moderna)	<b>DOSIS DE REFUERZO DE J&amp;J</b> (al menos 2 meses después del 1er J&J)
<p><b>Recibiste:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Un trasplante de órgano y toma la medicina para suprimir el sistema inmunológico</li> <li>▶ Trasplante de células madre en los últimos 2 años o está tomando medicamentos para suprimir el sistema inmunitario</li> </ul> <p><b>Activamente tienes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ El cáncer y recibe el tratamiento por tumores o cánceres de la sangre</li> <li>▶ Inmunodeficiencia primaria moderada o severa (como síndrome DiGeorge, síndrome de Wiskott-Aldrich)</li> <li>▶ Infección de VIH avanzada o no tratada</li> <li>▶ El tratamiento activo con corticosteroides de dosis alta u otras medicinas que pueden suprimir su respuesta inmunitaria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 65+</li> <li>▶ 18-64 años con alto riesgo de exposición ocupacional o institucional. Esto incluye:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ healthcare workers</li> <li>✓ primeros respondedores</li> <li>✓ profesores/personal escolar</li> <li>✓ personal de guardería</li> <li>✓ trabajadores de comestibles</li> <li>✓ trabajadores agrícolas</li> <li>✓ trabajadores de refugios para personas sin hogar</li> <li>✓ prison/jail/correctional staff</li> <li>✓ trabajadores de hogar de ancianos o de instalación a plazo largos</li> <li>✓ trabajadores industriales</li> <li>✓ Trabajadores del servicio postal</li> <li>✓ trabajadores de tránsito públicos</li> </ul> </li> <li>▶ 18-64 years of age with a medical condition from the list below:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cáncer</li> <li>✓ Enfermedad de riñón crónica</li> <li>✓ EPOC, incluso asma</li> <li>✓ Demencia</li> <li>✓ Diabetes tipo 1 o 2</li> <li>✓ Síndrome de Down</li> <li>✓ Enfermedad de Arteria coronaria incluso: Paro Cardíaco o cardiomiopatías</li> <li>✓ Infección de VIH</li> <li>✓ Enfermedades de inmunodeficiencia primaria (es decir, Wiskott-Aldrich, Benta, ALPS)</li> <li>✓ Sobrepeso</li> <li>✓ Personas embarazadas y recién embarazadas (durante al menos 42 días después de la finalización del embarazo)</li> <li>✓ Anemia de células falciformes o talasemia</li> <li>✓ fumador actual o exfumador</li> <li>✓ Trasplante de células madre en los últimos 2 años</li> <li>✓ Accidente/enfermedad cerebrovascular</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Todos los individuos 18+ quién sólo recibió 1 dosis de la vacuna de Covid J&amp;J</li> </ul>

Las personas deben hablar con su proveedor de atención médica sobre su afección médica y si es apropiado para ellos recibir una dosis adicional. Los pacientes pueden optar por mezclar y combinar las dosis de la vacuna de refuerzo COVID-19, utilizando el marco de tiempo de la dosis de refuerzo de su serie original.